



15
ФЕВРАЛЯ



ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ,

ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

ИППП часто протекают скрыто. При несвоевременном обращении к врачу могут привести к серьезным осложнениям и отдаленным последствиям. Наиболее частые из них - это воспалительные заболевания органов малого таза, внематочная беременность, невынашивание беременности, инфицирование плода и новорожденного ребенка, мужское и женское бесплодие, развитие онкопатологии и др.

15 февраля

В Брестской области организована
ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
по вопросам профилактики ИППП

УЗ "Брестский областной
кожно-венерологический диспансер"

■ по вопросам профилактики ИППП

8(0162) 59-26-43

Звонить с 10:00 до 12:00

Брестский областной ЦГЭ и ОЗ

■ по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа

8(0162) 53-07-06

Звонить с 8:00 до 16:00



Вирус папилломы человека – как не заболеть и не заразить другого

Вирус папилломы человека (ВПЧ) – один из распространённых возбудителей инфекций, передаваемых половым путём (ИППП).

ВПЧ передаётся в большей степени половым путём и приводит к появлению папиллом на коже, половых органах, в заднем проходе, во ротовой полости и горле.

Как правило, вирус полностью исчезает из организма за 1 – 2 года без специального лечения. Иногда папилломавирусная инфекция переходит в хроническую стадию и может стать причиной некоторых онкологических заболеваний.

Вирус способен на протяжении длительного времени абсолютно не проявлять себя симптомами. Как правило, о наличии ВПЧ пациент узнает уже при развитии его последствий: появления бородавок, папиллом, кондилом. В некоторых случаях о наличии вируса могут говорить следующие признаки:

- множественные разрастания новообразований – папиллом, бородавок, невус;
- отек или воспалительные очаги папилломы, их кровоточивость;
- жжение, зуд в генитальной области;
- кровянистые выделения в межменструальный период, в том числе после полового контакта;
- болевые ощущения и дискомфорта при близости обоих партнеров.

Факторы риска папилломавирусной инфекции

Пол и возраст. По данным ВОЗ, 40 – 75% населения инфицировано ВПЧ, но лишь у 3–9% заражённых проявляются симптомы заболевания. Чаще всего ВПЧ обнаруживается у людей молодого возраста, имеющих большое число половых партнёров, а также у девочек-подростков, не достигших половой зрелости (14 – 17 лет).

Прочие ИППП. Заражение инфекциями, передающимися половым путём, например: сифилис, гонорея, урогенитальный хламидиоз, трихомониази другими, также увеличивает риск заболеть папилломавирусной инфекцией.

Осложнения папилломавирусной инфекции

Основная опасность папилломавирусной инфекции – увеличение риска развития некоторых видов рака. Известно около 15 штаммов вируса, которые могут встраивать собственную ДНК в геном клеток слизистой оболочки, вырабатывать онкогены (активаторы роста опухолей) и нарушать работу защитных «противоопухолевых» белков.

Одни из опасных заболевания, которые может вызывать вирус папилломы человека – это рак шейки матки, анального канала, влагалища, вульвы, полового члена, горла.

Кроме онкологических заболеваний, могут возникнуть и другие осложнения (местные). Например, эрозии и язвы на месте папиллом, инфицирование ран при расчёсывании или случайном сдирании бородавок.

Профилактика папилломавирусной инфекции

Безопасное сексуальное поведение – основа профилактики ИППП и их осложнений.

Рекомендуется, с целью профилактики, использовать контрацептивы ограничив до минимума количество сексуальных партнеров. Если же есть повод для подозрения на заражение, следует немедленно пройти обследование у врача-дерматовенеролога, акушера-гинеколога или уролога.

С ростом онкологических заболеваний, учреждения здравоохранения города Бреста и Брестской области, для исследования на вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска (ВПЧ ВКР), доставляют биологический материал в централизованную бактериологическую лабораторию УЗ «Брестский областной кожно-венерологический диспансер», за счет бюджетных средств, в рамках диспансеризации для ранней диагностики рака шейки матки, здоровым женщинам целевой группы, которым в текущем году на момент тестирования исполнилось 30, 35, 40, 45, 50, 55 и 60 лет, не предъявляющих жалоб на момент взятия материала.

Берегите себя и своих близких.

Главный врач

УЗ «Брестский областной кожно-венерологический диспансер»

Ленёв Михаил Сергеевич